



www.regionalgeologie-ost.de

Computergrafik: D. FRANKE

Abb. 36.7 Regionale Verbreitung prävariszischer syngenesischer Sulfid-Oxidierzlager im Erzgebirge (Auswahl)

(nach L. BAUMANN & U. JOSIGER 1995; L. BAUMANN et al. 2000)

Als geologische Grundlage wurde eine Darstellung gewählt, wie sie für das Verständnis der Literatur bis in den Zeitraum 1995/2000 erforderlich ist. Aktuellere Versionen vgl. Abb. 36.9 (Kartierungseinheiten) und Abb. 36.10 (Deckeneinheiten)

1 - Hermsdorf; 2 - Brand; 3 - Bräunsdorf; 4 - Flöha-Plaue; 5 - Lengefeld; 6 - Herold; 7 - Jahnsbach; 8 - Günzdorf-Hormersdorf; 9 - Steinbüschel; 10 - Geyer; 11 - Elterlein; 12 - Aue (Kuttengrund); 13 - Bockau; 14 - Waschleithe; 15 - Schlettau; 16 - Crottendorf; 17 - Pöhla; 18 - Breitenbrunn; 19 - Johannegeorgenstadt; 20 - Hammerunterwiesenthal; 21 - Schmalzgrube; 22 - Medenec; 23 - Klingenthal; 24 - Kraslice