

DIETRICH FRANKE
Regionale Geologie von Ostdeutschland - Ein Wörterbuch

Zeit Ma	Regionale Gliederung		NW- und Zentral-Abschnitt (Kaulsdorf – Leutenberg – Lehesten)				SE-Abschnitt (Schleiz – Lobenstein)					
			neuere Gliederung (K. WUCHER et al. 2004)		ältere Gliederung (TGL 25234/13; H. PFEIFFER 1981b)		neuere Gliederung (K. WUCHER et al. 2004)					
327	Karbon Dinantium Viséum Unteres Mittel-Viséum Tournaisium Ober-Tournai Mittel-Tournai Unter-Tournai	Oberes Ober-Viséum	←← sudetische Diskordanz →→									
		Mittleres Ober-Viséum	Sonneberg-Gruppe		Teuschnitz-Formation	keine Untergliederung	Teuschnitzer Schichten	Teuschnitzer Konglomerat	Sonneberg-Gruppe		Teuschnitz-Formation nicht nachgewiesen	
		Unteres Ober-Viséum	Ziegenrück-Formation		Ob. Ziegenrück-Wechsellaager.-Subformation	Unt. Ziegenrück-Wechsellaager.-Subformation	Ziegenrücker Schichten	Grenzkongl.	Grauacke-Teilfolge		Ziegenrück-Formation	Grauwacke-Bordenschiefer-Wechsellaagerung
		Oberes Mittel-Viséum			Röttersdorf-Wechsellaager.-Subformation	Röttersdorf-Bordenschiefer-Subformation	Röttersdorfer Schichten	Ob. <i>fimbriatus</i> -Sandstein Keratophyr-Tuffe Grünauer Sandstein Wetzstein-Quarzit Unt. <i>fimbriatus</i> -Sandstein			Sandstein-Tonschiefer-Wechsellaagerung	
		Unteres Mittel-Viséum	Leutenberg-Gruppe		Kaulsdorf-Bordenschiefer-Subformation	Kaulsdorf-Wechsellaager.-Subformation	Kaulsdorfer Schichten	Kaulsdorfer Konglomerat	Bordenschiefer-Teilfolge		Röttersdorf-Formation	Bordenschiefer
					Kaulsdorf-Konglomerat	Kaulsdorf-Konglomerat	Kaulsdorfer Schichten	Kaulsdorfer Konglomerat			Sandstein-Tonschiefer-Wechsellaagerung	
					Hasenthal-Bordenschiefer	Hasenthaler Schichten	Hasenthaler Schichten	Hasenthaler Konglomerat			Wurstkonglomerat (Unteres Konglomerat)	
			Lehesten-Formation	Dachschiefer-Subformation	Lehestener Folge	Dachschiefer-Schichten	Dunkler Lagerstein Blauer Lagerstein Dunkelkiesiger Lagerstein	Keratophyrtuff-Kohlenkalk-Schichten	Buschteich-Folge		? Schichtlücke ?	
344		Ober-Tournai	Rußschiefer-Formation		Rußschiefer-Schichten	Breternitz-Tuffit	Rußschf.-Schichten	Pseudotuffit-Sch.				
		Mittel-Tournai	Saalfeld-Gruppe (Gleitsch-Formation/ Pfaffenberg-Subformation)		Saalfelder Folge (Gattendorfia-Kalknollen-Schichten)		Knotenkalk Folge (Gattendorfia-Kalknollen-Schichten)		Schleiz-Gruppe (Göschitz-Formation/ Löhma-Subformation)		Kerato-phyrtuffe Kohlenkalk graugrüne Schiefer	
361	Unter-Tournai	Saalfelder Folge (Gattendorfia-Kalknollen-Schichten)			Saalfelder Folge (Gattendorfia-Kalknollen-Schichten)		Knotenkalk Folge (Gattendorfia-Kalknollen-Schichten)					

www.regionalgeologie-ost.de

Computergrafik: D. FRANKE

Tab. 10 Korrelation unterschiedlicher Gliederungen des Dinantium im ostdeutschen Anteil des Ziegenrück-Teuschnitzer Synklinorium/Thüringisches Schiefergebirge

generalisiert nach H. PFEIFFER 1981b; K. WUCHER 2001; H. BLUMENSTENGEL et al. 2003; K. WUCHER et al. 2004; H. BLUMENSTENGEL (2008)

Schematische Darstellung ohne Mächtigkeits- und absoluten Zeitbezug
Gliederung und Datierung der Einheiten der Referenzkala entsprechen den Normen der International Stratigraphic Chart 2016/04,
die Farbgebung erfolgte nach dem CMYK Color Code der Commission for the Geological Map of the World